

**NOMBRE DEL PRODUCTO**BOTREFIN<sup>®</sup>**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

BOTREFIN<sup>®</sup> A es un fungicida con acción preventiva y curativa para el tratamiento Botritis, Esclerotinia y Colletotricum en hortalizas y tabaco.

**COMPOSICIÓN**

Ciprodinil 37,5% + Ffludioxonil 25%

**FORMULACIÓN**

Granulado dispersable en agua (WG)

**Nº DE REGISTRO**

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº ES-01164

**PRESENTACIÓN**

Formato	Uds./Caja	I/Pallet
Bolsa multicapa 1 kg	10	300

**RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días)**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	N. APLICACIONES	PS
Berejena	Botritis y Sclerotinia	1 kg/ha	1 envernadero 2 aire libre	3
Calabacín y Pepino	Botritis y Sclerotinia	1 kg/ha	1	3
Cebolla y Cebolleta	Botritis	1 kg/ha	1	7
Fresal	Botritis, Colletotricum	1 kg/ha	1	1
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Botritis y Sclerotinia	0,6 kg/ha	1	7
Lechuga y similares	Botritis y Sclerotinia	0,6 kg/ha	2	7
Pimiento y Tomate	Botritis y Sclerotinia	1 kg/ha	1	3
Tabaco	Botritis y Sclerotinia	0,6 kg/ha	2	7

**MODO DE APLICACIÓN**

Tratamiento fungicida por pulverización foliar.

En berenjena y tomate, aplicar durante los estadios fenológicos de BBCH 67-89 (desde floración hasta maduración).

En calabacín y pepino, aplicar durante BBCH 71-79 (primeros frutos han alcanzado la dimensión típica).

En cebolla y cebolleta, aplicar durante los estadios BBCH 20-47 (desde hojas bien desarrolladas hasta 10% de hojas dobladas).

En fresa, aplicar durante BBCH 55-89 (desde aparición primeros flores hasta la segunda recolección).

En lechuga y similares, aplicar durante los estadios BBCH 12-49 (2º hoja verdadera desplegada hasta alcance tamaño típico).

En pimiento, aplicar durante los estadios BBCH 55-89 (desarrollo flores hasta maduración frutos).  
En tomate, aplicar desde floración hasta maduración de frutos (BBCH 67-89).

En tabaco, aplicar durante BBCH 51-89.

## CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El uso de BOTREFIN<sup>®</sup> no resulta seguro para su aplicación manual en cultivos de porte alto en invernadero.

Se recomienda el uso de BOTREFIN<sup>®</sup> en alternancia de fungicidas con otro modo de acción, la aplicación en los estadios de desarrollo más tempranos o el uso del producto como tratamiento protector y el uso de otras medidas tales como variedades resistentes y buenas prácticas agrícolas.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

No realizar más aplicaciones de las indicadas en cada cultivo y en caso de ser necesario realizar más aplicaciones, tratar siempre de alternar con productos que no posean el mismo modo de acción.

### Gestión de envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador.

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

**Advertencia:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**

**Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA  
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre,  
28-30, 08017 Barcelona**