

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

AZOFIN®

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

AZOFIN® es un fungicida polivalente contra mildiu, oídio y otras enfermedades en diversos cultivos.

**COMPOSICIÓN**

Azoxistrobin 25%

**FORMULACIÓN**

Suspensión concentrada (SC)

**Nº DE REGISTRO**

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº ES-01181

**PRESENTACIÓN**

Formato	Uds./Caja	I/Pallet
Botella (HPDE) de 1 l	12	600
Garrafas (HPDE) de 5 l	4	800

**RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días)**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l/ha)	N. APLIC.	PS
<b>Ajo, Cebolla, Chalote Alcachofa</b>	Alternaria, Mildiu, Roya Mildiu, Oidiopsis	0,8-1	3	7
<b>Apio</b>	Cercospora, Septoria	0,8-1	2	7
<b>Arroz</b>	Piricularia, Helminthosporium	1	2	7
<b>Berenjena, Pimiento, Tomate</b>	Cladosporiosis, Mildiu, Oidiopsis, Alternaria	0,7-0,8 (en campo) 0,8-1 (invernadero)	3	3
<b>Calabacín, Calabaza, Melón, Sandía, Pepino, Pepinillo</b>	Mildiu, Oidio	0,7-0,8 (en campo) 0,8-1 (invernadero)	3	3
<b>Cebada, Trigo</b>	Roya, Septoria, Rincosporium	0,8-1	2	35
<b>Cebollino</b>	Septoria	0,8-1	2	7
<b>Brassicac</b>	Mycosphaerella, Alternaria	0,8-1	2	3
<b>Espárrago</b>	Roya	0,8-1	2	NP
<b>Fresal</b>	Antracnosis	0,8-1	3	3
<b>Guisante verde Judía verde</b>	Oidio, Botritis, Chancro, Roya	0,8-1	2	3
<b>Hinojo</b>	Septoria	0,8-1	2	14
<b>Lechuga y similares</b>	Mildiu, Esclerotinia, Oidio	0,8-1	2	7
<b>Patata</b>	Viruela	3	1	
<b>Puerro</b>	Cladosporiosis, Mildiu, Oidiopsis, Alternaria	0,8-1	3	3
<b>Zanahoria</b>	Alternaria	0,8-1	3	14

## MODO DE APLICACIÓN

---

Aplicar a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos mediante pulverización foliar mecánica o manual excepto en patata que se aplica en el surco de siembra.

En arroz aplicar desde grano lechoso temprano hasta maduración de las semillas. No aplicar en suelos con menos de un 30% de arcilla.

En cebada y trigo usar la dosis más alta en caso de presión elevada. BBCH 32-61.

## CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

---

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Para evitar el desarrollo de resistencias limitar el número de aplicaciones y alternar el uso de fungicidas de distinto modo de acción. Evitar el uso repetido de fungicidas con el mismo modo de acción.

Seguir las instrucciones de la etiqueta con dosis recomendada y calendario de aplicación.

### Gestión de envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador.

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

**Advertencia:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA  
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre,  
28-30, 08017 Barcelona