

NOMBRE DEL PRODUCTO

SERINAL®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SERINAL® es un fungicida de sistema ascendente y descendente, con acción preventiva y curativa a base de 80% p/p FOSETIL-AL (800 g/kg). Es absorbido principalmente por hojas y también por raíces y se distribuye por toda la planta.

COMPOSICIÓN

FOSETIL-AL 80% [WG] P/P

FORMULACIÓN

GRANULO DISPERSABLE [WG].

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 25.504

PRESENTACIÓN

Formato	Uds.
Bolsa de aluminio-poliéster-poliétileno	100,250 y 500 g
Bolsa de complejo aluminio-poliéster-poliétileno	≤ de 5 kg
Cajas de cartón con bolsa interior de complejo aluminio-poliéster-poliétileno	0,5,1 y 5 kg

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO. Aplicaciones y dosis autorizadas

USO	AGENTE	DOSIS	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Cítricos	FITOPHTORA	(ver nota)	En plantaciones establecidas, efectuar 3 aplicaciones en abril, julio y octubre/noviembre a dosis de 250-300 g/Hl. En plantas injertadas, tratar 15 días antes de realizar el injerto y repetir el tratamiento 3 o 4 semanas después a dosis de 250-300 g/Hl. En viveros y plantaciones jóvenes, utilizar la dosis de 300 g/Hl, en intervalos de 2 meses. Gasto máximo de producto de 4,5 kg/ha.
Frutales de pepita	FITOPHTORA	(ver nota)	Efectuar 3 aplicaciones en abril, julio y septiembre/octubre a dosis de 250 - 300 g/Hl. Para la protección del ramillete floral, realizar 2 aplicaciones durante la floración a razón de 250 - 300 g/Hl. Para la protección de las yemas de flor, tratar a la caída de los pétalos, repitiendo una o dos veces más, cada 15 días, a dosis de 250 g/Hl. Gasto máximo de producto de 3,6 kg/ha.

Nogal	FITOPHTORA	(ver nota)	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Efectuar un máximo de 3 tratamientos, con un intervalo entre tratamientos de al menos 3 meses, y no más tarde del final de la floración, a una dosis de 250 – 300 g/hl, en un caldo de 800-1200 L/ha. Gasto máximo de producto de 3,6 kg/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Vid	MILDIU	250 - 300 g/Hl	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, la 1º antes de la floración y posteriormente otras 2 espaciadas 10-14 días. Gasto máximo de producto de 3,3 kg/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

Uso	P.S. (días)
Cítricos, Frutales de pepita	14
Vid	28
Nogal	NP

MODO DE APLICACION

Aplicar en pulverización foliar mediante tractor. Para conseguir una actuación eficaz del producto deben efectuarse las aplicaciones durante el periodo de crecimiento activo.

Incompatibles con abonos foliares que contengan Nitrógeno mineral. Incompatible con aceites y productos cúpricos. En caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir una semana entre el tratamiento con Serinal y el de Aceite.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,
08017 Barcelona