

NOMBRE DEL PRODUCTO

ADALGIS®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ADALGIS® es un herbicida de traslocación, principalmente absorbido por las hojas, selectivo para el control en post-emergencia de malas hierbas de hoja ancha (dicotiledóneas).

COMPOSICION

FLUROXIPIR 20% (ESTER METILHEPTIL) [EC] P/V

FORMULACIÓN

CONCENTRADO EMULSIONANTE [EC]

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 25.400

PRESENTACIÓN

Formato	Uds.
Botella de plástico (PET)	500 ml
Botella de plástico (PET)	1l
Garrafas de plástico (PET)	5 l
Botellas/garrafas de plástico HDPE	500 ml a 10 l
Botellas/garrafas de plástico f-HDPE	500 ml a 10 l

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días)

USO	AGENTE	Dosis %	Nº Aplic.	Vol. Caldo (l/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)	PS
Avena	DICOTILEDONEAS	0,75 - 1	Máx. 1	150-400 l/ha Si hay rebrotes de patata: 300- 400 l/ha	Aplicable a avena de invierno y primavera. Aplicar en post-emergencia, hasta no más tarde del final del encañado.	NP
Cebada	DICOTILEDONEAS	0,75 - 1	Máx. 1	150-400 l/ha Si hay rebrotes de patata: 300- 400 l/ha	Aplicable a cebada de invierno y primavera. Aplicar en post emergencia, desde 3 hojas del cereal hasta no más tarde del final del encañado	NP
Centeno	DICOTILEDONEAS	0,75 - 1	Máx. 1	150-400 l/ha Si hay rebrotes de patata: 300- 400 l/ha	Aplicar en post-emergencia, hasta no más tarde del final del encañado.	NP
Cítricos	DICOTILEDONEAS	1,5	Máx. 1	200-400 l/ha	Aplicar en post-emergencia de las malas hierbas. Aplicación dirigida al suelo, sin mojar los árboles	15
Gramíneas (prados de siembra)	DICOTILEDONEAS	1,5-2		200-400 l/ha En pradera establecida: 300- 400 l/ha	Aplicar en post-emergencia de las malas hierbas. Cuando se utiliza en tratamientos localizados en praderas permanentes, rotacionales o nuevas siembras de praderas de gramíneas, la concentración máxima no debe exceder de 300 ml/100 l de agua. El plazo de seguridad se refiere al plazo de espera para la entrada de ganado en las parcelas tratadas	14

Maíz	DICOTILEDONEAS	1	Máx. 1	150-400 l/ha Si hay rebrotes de patata: 300- 400 l/ha	Aplicar en post-emergencia de las malas hierbas, entre las 3 y 5 hojas del cultivo	NP
Maíz forrajero	DICOTILEDONEAS	1	Máx:1	150-400 l/ha Si hay rebrotes de patata: 300- 400 l/ha	Aplicar en post-emergencia de las malas hierbas, entre las 3 y 5 hojas del cultivo	NP
Olivo	DICOTILEDONEAS	1,5	Máx. 1	200-400 l/ha	Aplicar en post-emergencia de las malas hierbas. Aplicación dirigida al suelo, sin mojar los árboles	NP
Trigo	DICOTILEDONEAS	0,75 - 1	Máx. 1	150-400 l/ha Si hay rebrotes de patata: 300- 400 l/ha	Aplicar en post-emergencia, hasta no más tarde del final del encañado	NP
Triticale	DICOTILEDONEAS	0,75 - 1	Máx. 1	150-400 l/ha Si hay rebrotes de patata: 300- 400 l/ha	Aplicar en post-emergencia, hasta no más tarde del final del encañado.	NP

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar en pulverización normal con tractor para todos los usos o manual con lanza/pistola y mochila en olivo, cítricos y prados de gramíneas.

No hacer rotación de cultivos o escarificar hasta que no hayan pasado 7 días desde el tratamiento. No utilizar el producto en cultivos asociados con tréboles u otras leguminosas, podría ser usado en cultivos asociados a prados de gramíneas sólo si se éstas están firmemente establecidas, no utilizar en cultivos destinados a obtención de simiente.

No aplicar antes del 1 de marzo del año de la cosecha. No efectuar tratamientos en días de viento y tomar precauciones para evitar daños en cultivos colindantes, así como evitar solapes en la pulverización.

En olivo y cítricos, no aplicar en plantaciones de menos de 4 años.

No mojar los árboles, en especial los brotes jóvenes.

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

En condiciones de frío y/o humedad elevada, pueden aparecer daños en hojas jóvenes de frutales y otros cultivos. Sólo se debe aplicar con caldos neutros. No aplicar en mezclas con correctores de pH, mojantes, ni abonos foliares salvo en olivar. ADALGIS® ha demostrado su compatibilidad física con SIAPTON por lo que pueden hacerse tratamientos conjuntos en olivar.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,
08017 Barcelona