

NOMBRE DEL PRODUCTO

BADGE® SC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BADGE® SC es un fungicida cúprico con acción preventiva, a base del 13,6% p/v de cobre metal en forma de oxiclورو y 13,6% p/v en forma de hidróxido, equivalentes a 272 g/L de cobre

COMPOSICIÓN

HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC]
P/V

FORMULACIÓN

SUSPENSION CONCENTRADA [SC].

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 24.950

PRESENTACIÓN

Formato	Uds.
Frascos de polietileno de alta densidad	1 lt
Garrafas de polietileno de alta densidad	5 y 10 lt

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO. Aplicaciones y dosis autorizadas

Cultivo	Enfermedad	Dosis L/ha	Dosis % (L/100 L)	Nº max. aplicaciones	Intervalo	Caldo (L/ha)	Plazo Seguridad
Ajos, Cebolla, Chalota	BACTERIOSIS MILDUI	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	3
Alcachofa	ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDUI	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	21
Almendro	ABOLLADURA BACTERIOSIS CRIBADO MONILIA	3-3.5	0.2-0.4	1 desde caída de hojas hasta botón rosa	-	875-1500	14
Avellano, Nogal, Pistacho	BACTERIOSIS	3-3.5	0.2-0.4	1 desde caída de hojas hasta botón rosa	-	875-1500	14
Berenjena, Tomate (aire libre e invernadero)	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDUI	2-2.8	0.2-0.3 (tomate) 0.3-0.5 (berenjena)	4	7-14	600-800 (berenjena) 1000 (tomate)	3 (inv.) 10 (aire libre)
Brécol, Coliflor	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDUI	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	14
Cítricos	AGUADO BACTERIOSIS FOMOPSIS	3-3.4	0.2-0.4	2 Sin superar 7.72 L/ha y año	20	875-1500 Utilizar boquillas baja deriva del 50%	14
Cucurbitáceas (aire libre e invernadero)	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDUI	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	3 (piel comestible) 7 (piel no comestible)
Fresal (aire libre)	ANTRACNOSIS MILDUI	2-2.8	0.2-0.4	4	14	600-800	7

Frutales de hueso	ABOLLADURA BACTERIOSIS CRIBADO MONILIA MOTEADO	3-3.5	0.2-0.4	1 desde caída de hojas hasta botón rosa	-	875-1500	N.P.
Frutales de Pepita	MOTEADO (Manzano, Peral)	2-2.5 (Prefloración) 1-1.5 (Postfloración)	0.2-0.5 (Prefloración) 0.2-0.3 (Postfloración)	4 sin superar 5.51 L/ha y año.	7-14	500-1250 (Moteado) y 875-1500 (Bacteriosis, desde postcosecha-hinchado yemas).	21
	BACTERIOSIS	3.5 (Trat. invierno)	0.2-0.4				N.P.
Hortícolas de hoja	MILDIU	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	7
Hierbas aromáticas	MILDIU	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	21
Kiwi	BACTERIOSIS	2-2.6	0.2	1 desde caída de hojas a preflorescencia		1000-1300	N.P.
Olivo	REPILO TUBERCULOSIS	2-2.9	0.2-0.3	3 con máximo 7.72 L/ha y año	14	1000 Utilizar boquillas baja deriva 50%	14
Patata	ALTERNARIA MILDIU	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	7
Pimiento	ALTERNARIA ANTRACNOSIS BACTERIOSIS MILDIU	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	7
Remolacha azucarera	CERCOSPORA	2-2.8	0.2-0.5	4	7-14	600-800	14
Vid	BACTERIOSIS	2-2.3	0.2-0.3	1 apl. desde brotación (0.2-0.25%) a postfloración (0.2-0.3%)		670-1000 (bacteriosis.) 600-800 L/ha (mildiu)	21
	MILDIU	1.25-2.3 (Prefloración) 1.8-2.3 (Postfloración)					

MODO DE APLICACION

Aplicar durante el desarrollo de la hoja en hortícolas y remolacha azucarera.

Debe ser usado siguiendo siempre una estrategia de control preventivo, antes del establecimiento de la enfermedad.

Aplicar en pulverización foliar, tratando de mojar toda la superficie por el haz y el envés.

Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o manual. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual.

En condiciones de frío y/o humedad elevada, pueden aparecer daños en hojas jóvenes de frutales, vid y otros cultivos. Evite la realización de tratamientos en esas circunstancias.

En determinadas ocasiones, se puede presentar manchado de bayas y frutos. Para evitarlo, se debe reducir el tamaño de gota de pulverización o realizar la aplicación mediante pulverizadores a presión de chorro transportado.

Sólo se debe aplicar con caldos neutros.

En caso de tratamientos a volumen reducido, usar la dosis más alta, de modo que se mantenga una concentración mínima por hectárea.

El preparado no se usará en combinación con otros productos fitosanitarios.



Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

**Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,
08017 Barcelona**