

NOMBRE DEL PRODUCTO

ERGOMAR® MICRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ERGOMAR® MICRO es un abono líquido con extracto de *Ascophyllum nodosum* al 100%, obtenido mediante un proceso exclusivo de extracción en frío PEF, lo que le permite mantener intactas todas las propiedades beneficiosas de las algas.

El contenido en polisacárido, polifenoles y osmolitos compatibles se produce una mejora de la estructura celular que conduce a una mayor capacidad de retención y aprovechamiento del agua intracelular, previniendo posibles estreses abióticos. Adicionalmente, se consigue mejorar estructuralmente la pared celular, permitiendo reforzarla como barrera a la entrada de microorganismos fitopatógenos.

ERGOMAR® MICRO incorpora una serie de microelementos que complementan la acción del extracto de alga.

El resultado final obtenido es similar al que tienen las fitohormonas, por lo que el producto es muy activo a dosis reducidas. Aplicado vía suelo, ya sea en campo como en semilleros y/o trasplantes, presenta una biodegradabilidad más progresiva lo que le permite una mayor persistencia.

CONTENIDO EN ELEMENTOS FERTILIZANTES

Producto especial a base de extracto líquido de *Ascophyllum nodosum*, que aporta a la planta sustancias para regular y potenciar la absorción de nutrientes y favorecer el equilibrio fisiológico normal.

Contenidos garantizados:

Extracto de algas *Ascophyllum nodosum* 100% con

Manitol: >0,1 % p/p

N total: 3,9%

MgO soluble en agua: 3% p/p

B soluble en agua: 0,9% p/p

Mo soluble en agua: 0,2% p/p

Intervalo de estabilidad de la fracción quelada: pH 7,3

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACION

Aplicar en general mediante pulverización normal a la dosis de 2 – 3 L/ha o 2 – 3 L/1000L en la mayoría de los cultivos, asegurándose de utilizar un volumen adecuado para cubrir la superficie de las hojas.

Para casos particulares, seguir las recomendaciones de la siguiente tabla.

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento
Cebolla, ajo y puerro	2	Aplicar cada 3 semanas, a partir de 4-5 hojas.
Cítricos	2 - 3	Aplicar antes de la floración y antes de la caída fisiológica de frutos.
Cucurbitáceas	2 - 3	Aplicar desde la floración y durante el desarrollo del fruto cada 2 semanas.

Fresa	2 - 3	Iniciar el ciclo de aplicaciones 2-3 semanas después de la plantación y aplicar cada dos semanas.
Frutales de hueso	2 - 3	Aplicar a principio floración, caída de pétalos y inicio de crecimiento de fruto
Frutales de pepita	2 - 3	Aplicar al hinchado de yemas, en botón rosa, inicio de floración y cuajado
Guisante, alubia y soja	2	Aplicar en estado de 4-6 hojas y en prefloración.
Lechuga, coles, tomate, pimiento, y otras hortícolas de fruto	2 - 3	Aplicar cada 2 semanas, comenzando 2 semanas después del trasplante
Olivo y otros cultivos arbóreos	2 - 3	Aplicar al inicio de la floración, al cuajado y durante el desarrollo inicial del fruto
Patata	2 - 3	Aplicar a inicio formación del tubérculo y 2 semanas después
Vid	200 cc/ha	Aplicar desde brotación a floración y durante el crecimiento del racimo

Aplicaciones mediante fertirrigación o goteo:

Dosis total 20-25 L/ha dividida en varias aplicaciones de 2-4 l/ha cada dos semanas para mantener una respuesta extendida del cultivo.

En Cultivos hortícolas: 1,5-2 L/ha, aplicaciones semanales.

METODO DE EMPLEO

ERGOMAR® MICRO se aplica mediante pulverización foliar o aplicado al suelo mediante riego por goteo, pívot, microaspersión, tubo perforado o en surcos.

Para la preparación del caldo, llene el tanque del pulverizador hasta la mitad con agua, añadiendo la cantidad necesaria de ERGOMAR® MICRO y agitando continuamente hasta su total disolución. Proceda al triple enjuagado del envase y complete el llenado del depósito mientras continúa agitando, incluso durante la aplicación. En tratamientos foliares usar suficiente caldo para obtener la máxima dispersión y adherencia a las hojas. Aplicar durante las horas frescas del día y nunca antes o después de las lluvias.

Para aplicaciones vías suelo por irrigación o goteo, diluir ERGOMAR® MICRO en una relación de 1:50 partes de agua o solución a aplicar, agitando continuamente la mezcla

Aplicaciones tardías posteriores a la cosecha, consiguen una óptima preparación del cultivo para la siguiente campaña.

AGITAR ANTES DE USAR, el producto se puede separar en dos fases, aunque esto no altera su eficacia.

El producto es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Cualquier otro producto debe añadirse una vez que ERGOMAR® MICRO haya sido incluido y mezclado en la cuba. Conservar en su envase original. Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado, protegidos del sol. Evitar temperaturas extremas, menores de 5°C y mayores de 40°C. Si existe riesgo de heladas, almacenar el producto por encima del nivel del suelo. Evitar cambios drásticos de temperatura.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30, 08017 Barcelona