

NOMBRE DEL PRODUCTO

AFFINITY®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

AFFINITY® es un herbicida de contacto para aplicación de postemergencia que actúa contra malas hierbas dicotiledóneas y rebrotes en especies leñosas. Se emplea también como desecante de patata y para malas hierbas en zonas no cultivadas, caminos y vías férreas.

COMPOSICIÓN

CARFENTRAZONA-ETIL 6% p/v (60 g/L)

FORMULACIÓN

MICROEMULSIÓN [ME]

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 25.453

PRESENTACIÓN

Formato	Uds.
Garrafas de polietileno de alta densidad	5 lt
Caja	4 x 5 lt

MODO DE ACCIÓN

AFFINITY® es un herbicida de contacto que pertenece a la familia química de las triazolinonas (Grupo HRAC: E). Se absorbe con rapidez por las hojas a través de la cutícula hasta alcanzar el parénquima. Bloquea la biosíntesis de la clorofila e inhibe la protoporfirógeno oxidasa, PPO, en los cloroplastos.

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días)

Cultivo	Agente	Dosis (L/ha)	Nº aplic.	P.S. (días)
Avellano	Malas hierbas	0,25-0,3	1	7
	Supresión de rebrotes/varetas	1		
Ciruelo, cítricos, kiwi, manzano, melocotonero, olivo, peral, vid	Malas hierbas	0,25-0,3	1	7
	Supresión de rebrotes/varetas	0,9-1		
Locales y almacenes (Para instalaciones de viveros)	Malas hierbas	0,25-0,3	1	7
Áreas no cultivadas (agrícola y forestales)	Malas hierbas	0,25-0,3	1	NP
Patata	Desecante del cultivo	1,0	2	3

Cultivo	Agente	Dosis (L/ha)	Nº aplic.	P.S. (días)
Uso menor* Almendro	Malas hierbas	0,25 - 0,3	1	7
	Supresión de rebrotes/varetas	0,9 - 1		

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar en postemergencia, mediante pulverización normal con tractor o manualmente, utilizando un volumen de caldo de 300-500 l/ha (nunca inferior).

Para el control de rebrotes realizar una única aplicación localizada y dirigida, a la dosis de 0,9 - 1 L/ha (utilizar la dosis más alta para avellano y vid). Evitar en todo momento que la deriva alcance la vegetación del cultivo y/o la cercana al mismo. Para obtener óptimos resultados, aplicar cuando los rebrotes (varetas) presenten una longitud de 10-15 cm y no estén lignificados. Como desecante de patata, realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 5-7 días (sólo aplicación con tractor en pulverización normal) y un volumen de caldo de 300-500 L/ha asegurando una distribución precisa y uniforme, así como una penetración adecuada del producto en la vegetación. El producto actúa por contacto sin dejar residuos en el tubérculo.

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

Hay que evitar el contacto de la pulverización con las hojas y partes verdes de los cultivos. Para su correcta aplicación se recomienda el uso de boquillas anti-deriva y trabajar con la menor presión posible (2-3 atmósferas) con el fin de evitar/reducir el número de gotas finas. Aplicar con campana protectora. No aplicar en días con viento. Emplear velocidades de avance adecuadas.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

**Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L.
Ronda General Mitre, 28-30, 08017 Barcelona**