

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

MASTER MAX ®

**CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO**

MASTER MAX ® es un herbicida que controla las malas hierbas gramíneas anuales y vivaces en postemergencia precoz de las mismas. Controla las malas hierbas de emergencia temprana como *Alopecurus spp.* y *Lolium spp* y las de emergencia en primavera como *Echinochloa spp.*, *Setaria spp.* y *Digitaria spp.*

**COMPOSICIÓN**

QUIZALOFOP-P-ETIL 10% [EC] P/V

**FORMULACIÓN**

Concentrado emulsionante [EC]

**N. DE REGISTRO**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el núm. 22.501

**PRESENTACIÓN**

Envases Botellas y garrafas de 5 L

**RECOMENDACIONES DE USO**

USO	AGENTE	Dosis	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Adormidera	Gramíneas anuales	0,4 - 1,5 l/ha	200-400 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional; exclusivamente semillas de adormidera): Aplicar en pulverización normal en post-emergencia del cultivo contra las malas hierbas gramíneas anuales y gramíneas vivaces en post-emergencia precoz de las mismas, en una sola aplicación.
	Gramíneas plurianuales			
Alfalfa	Gramíneas anuales	0,4 - 0,6 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar contra malas hierbas gramíneas anuales en otoño o en primavera.
	Gramíneas plurianuales	0,4 - 1,5 l/ha	200- 400 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional; exclusivamente para uso forrajero del grano): Aplicar en pulverización normal en post-emergencia del cultivo contra las malas hierbas gramíneas anuales y gramíneas vivaces en post-emergencia precoz de las mismas, en una sola aplicación.
Almorta	Gramíneas anuales			
	Gramíneas plurianuales	0,4 - 1,5 l/ha	200- 400 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional; exclusivamente para uso como grano): Aplicar en pulverización normal en post-emergencia del cultivo contra las malas hierbas gramíneas anuales y gramíneas vivaces en post-emergencia precoz de las mismas, en una sola aplicación.

Colza	Gramíneas anuales Gramíneas plurianuales	0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 65 (plena floración: 50 % de las flores de la inflorescencia principal, abiertas; caen los pétalos de las flores más viejas).
Garbanzo	Gramíneas anuales Gramíneas plurianuales	0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 79 (Los frutos han alcanzado el tamaño propio de su especie/ variedad).
Girasol	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 71 (las semillas del borde del capítulo de color gris y tamaño final).
Guisante para grano	Gramíneas anuales Gramíneas plurianuales	0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 89 (Madurez completa: todas las vainas, secas y marrones; semillas, secas y duras (madurez seca)).
Haba para grano	Gramíneas anuales Gramíneas plurianuales	0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 79 (Los frutos han alcanzado el tamaño propio de su especie/ variedad).
Haba verde	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Para producción con y sin vaina. Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 75 (El 50 % de las vainas alcanza la longitud típica, las judías empiezan a llenarse).
Judía para grano	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 75 (El 50 % de las vainas alcanza la longitud típica, las judías empiezan a llenarse).
Judía verde	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Para producción con y sin vaina. Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 75 (El 50 % de las vainas alcanza la longitud típica, las judías empiezan a llenarse).
Leguminosas forrajeras	Gramíneas anuales Gramíneas plurianuales	0,4 - 1,5 l/ha	200-400 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional; exclusivamente para uso como grano en yeros, veza, y algarroba, alverja): Aplicar en pulverización normal en post-emergencia del cultivo contra las malas hierbas gramíneas anuales y gramíneas vivaces en post-emergencia precoz de las mismas, en una sola aplicación.
Lenteja	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha		

	Gramíneas plurianuales	1 - 1,5 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 79 (los frutos han alcanzado el tamaño propio de su especie/variedad).
Patata	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 74 (50 % de las bayas de la fructificación de 1er grado han alcanzado su tamaño final).
Remolacha azucarera	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 13 (2 hojas (1er par de hojas), desplegadas) hasta BBCH 49 (la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha).
	Gramíneas plurianuales	1 - 2 l/ha		
Soja	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas verdaderas desplegadas en el 1er nudo) hasta BBCH 71 (10 % de las vainas de tamaño final (15 - 20 mm)).
	Gramíneas plurianuales	1 - 1,5 l/ha		
Tomate	Gramíneas anuales	0,5 - 0,75 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas verdaderas desplegadas en el 1er nudo) hasta BBCH 81 (El 10% de los frutos muestra el color típico de madurez).
	Gramíneas plurianuales	1 - 1,5 l/ha		
Zanahoria	Gramíneas anuales	0,6 l/ha	200-400 l/ha	Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 49 (se alcanza la forma y el tamaño típico de la raíz).

USO	P.S (Días)
Haba verde, Judía verde, Tomate, Zanahoria	21
Alfalfa, Alhova, fenogreco, Almorta, Garbanzo, Girasol, Guisante para grano, Haba para grano, Judía para grano, Leguminosas forrajeras, Lenteja, Patata, Soja	45
Remolacha azucarera	60
Adormidera, Colza	90

## MODO DE APLICACIÓN

Aplicar MASTER MAX® en pulverización normal en post-emergencia o post-trasplante del cultivo. Volumen de caldo: 200-400 l/ha. Adoptar precauciones para evitar riesgo de daños a los cultivos de cereales colindantes. Después de la aplicación del producto esperar 28 días para la siembra de los cultivos rotativos siguientes. Se deberá esperar 3 meses antes de sembrar cereales en las parcelas tratadas. No usar en combinación con otros productos.

## CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

**Advertencia:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes.

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30, 08017  
Barcelona