

NOMBRE DEL PRODUCTO

BORDEAUX GOWAN® WG

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BORDEAUX GOWAN® WG es un fungicida cúprico con acción preventiva, a base del 20% p/p de cobre metal en forma de sulfato cuprocálcico o Caldo Bordelés, para el tratamiento de enfermedades cuales son: Alternariosis, Abolladura, Bacteriosis, Cercospora, Moniliosis, Moteado y otros hongos endófitos.

COMPOSICIÓN

SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P (200 g/kg)

FORMULACIÓN

GRANULOS DISPERSABLE EN AGUA (WG)

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 25.046

PRESENTACIÓN

Sacos multicapa de 1.5; 10 y 20 kg

RECOMENDACIONES DE USO. Aplicaciones y dosis autorizadas

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo (L/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajo	Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans Bacteriosis Helmintosporiosis del ajo, Alternaria embellisia Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor	0,6 - 0,9 %	Máx. 4	7-12	200-500 l/ha	Aplicar desde que el cotiledón es visible en forma de gancho hasta que las hojas estén muertas y el bulbo completamente seco. (BBCH 10 -49). Dosis aplicación: 2 – 3 kg/ha.
Albaricoquero	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans	0,4 - 0,8 %	1	-	600-1000 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, con el 50-100% de la hoja caída. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
	Bacteriosis Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus Monilia, Monilinia spp. Moteado del melocotonero, Venturia carpophila	0,6 - 0,8 %			600-1200 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, desde caída de hojas hasta inicios de brotación o botón rosa del siguiente período vegetativo. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha

Almendro	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus Monilia, Monilinia spp. Moteado del melocotonero, Venturia carpophila	0,4 - 0,8 %	1	-	500-1000 l/ha	Aplicar tratamientos desde la caída de la hoja hasta inicios de la brotación o botón rosa (tratamientos de otoño-invierno). Dosis aplicación: 5 - 7,5 kg/ha
Avellano	Bacteriosis. Monilia, Monilinia spp.	0,4 - 0,8 %	1		500-1000 l/ha	Aplicar tratamientos desde la caída de la hoja hasta inicios de la brotación o botón rosa (tratamientos de otoño-invierno). Dosis aplicación: 5 - 7,5 kg/ha
Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,5 - 0,9 %	3-4		600-1000 l/ha	Aplicar al aire libre y en invernadero desde que la 5 hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta madurez completa del fruto (BBCH 15-89). Dosis aplicación: 3,8- 5 kg/ha (aire libre), 3,8-4,2 kg/ha (invernadero con lanza/pistola), 3,8 - 4,3 kg/ha (invernadero con mochila).
	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Bacteriosis	0,6 - 0,9 %	3-6	7-12	600-900 l/ha	
Cebolla	Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans	0,6 - 0,9 %	Máx. 4	7-12	200-500 l/ha	Aplicar desde que el cotiledón es visible en forma de gancho hasta que las hojas estén muertas y el bulbo completamente seco. (BBCH 10 - 49). Dosis aplicación: 2 - 3 kg/ha.
	Bacteriosis Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor					
Cerezo	Lepra del cerezo, Taphrina wiesneri	0,4 - 0,8 %			600-1000 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, con el 50-100% de la hoja caída. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
	Bacteriosis Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus Monilia, Monilinia spp. Moteado, cribado del cerezo, Venturia cerasi	0,6 - 0,8 %	1	-	600-1200 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, desde caída de hojas hasta inicios de brotación o botón rosa del siguiente período vegetativo. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
Chalote	Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans	0,6 - 0,9 %	Máx. 4	7-12	200-500 l/ha	Aplicar desde que el cotiledón es visible en forma de gancho hasta que las hojas estén muertas y el bulbo completamente seco. (BBCH 10 -49). Dosis aplicación: 2 -3 kg/ha.
	Bacteriosis Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor					
Ciruelo	Ciruelas del diablo, lepra del ciruelo, Taphrina pruni	0,4 - 0,8 %	1	-	600-1000 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, con el 50-100% de la hoja caída. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha

	Bacteriosis Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus Monilia, Monilinia spp. Moteado del melocotonero, Venturia carpophila	0,6 - 0,8 %			600- 1200 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, desde caída de hojas hasta inicios de brotación o botón rosa del siguiente período vegetativo. Dosis: 5 ± 7,5kg/ha
Cítricos	Bacteriosis Mancha negra de los cítricos, Phyllosticta citricarpa	0,2 %	Máx. 2	Mín. 7	2500- 3750 l/ha	Aplicar desde el comienzo de la maduración del fruto hasta maduración avanzada. (BBCH 80-85). Dosis 5 - 7,5 kg/ha con un máximo de 10,5 kg/ha y año.
	Phytophthora spp.					Contra aguado causado por Phytophthora citrophthora y Ph.nicotinae var. parasitica. Aplicar desde el comienzo de la maduración del fruto hasta maduración avanzada. (BBCH 80-85). Dosis 5 - 7,5 kg/ha con un máximo de 10,5 kg/ha y año.
	Mal seco de los cítricos, Plenodomus tracheiphilus					Contra fomopsis (Plenodomus tracheiphilus). Aplicar desde el comienzo de la maduración del fruto hasta maduración avanzada. (BBCH 80-85). Dosis 5 - 7,5 kg/ha con un máximo de 10,5 kg/ha y año.
Cucurbitáceas de piel comestible	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	0,5 - 0,75 %	Máx. 4	7-12	600- 800 l/ha	Incluye pepino y calabacín al aire libre. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta madurez completa del fruto(BBCH 13-89) Dosis aplicación: 3,8 – 5 kg/ha.
	Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare	0,6 - 0,75 %				
	Bacteriosis					
	Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina					
Cucurbitáceas de piel no comestible	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	0,5 - 0,75 %	Máx. 4	7-12	600- 800 l/ha	Incluye melón, sandía y calabaza, al aire libre. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta madurez completa del fruto (BBCH 13-89) Dosis aplicación: 3,8 - 5 kg/ha.
	Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare	0,6 - 0,75 %				
	Bacteriosis					
	Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina					

Frutales de pepita	Moteado o roña del manzano, <i>Venturia inaequalis</i> Moteado o roña del peral, <i>Venturia pyrina</i>	0,25 - 0,5 %			500-1000 l/ha	Aplicar en prefloración (BBCH 01 hasta BBCH 55). Dosis aplicación: 2,5-5 kg/ha con un máximo de 7,5 kg/ha y año.
Granado	Bacteriosis Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> <i>Monilia</i> , <i>Monilinia</i> spp	0,6 - 0,8 %	1	-	600-1000 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, desde la caída de la hoja hasta inicios de la brotación o botón rosa. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
	<i>Venturia</i> spp.					Contra moteado (<i>Venturia</i> spp.). Aplicar en tratamientos de invierno, desde la caída de la hoja hasta inicios de la brotación o botón rosa. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
Melocotonero	Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i>	0,4 - 0,8 %			600-1000 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, con el 50-100% de la hoja caída. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
	Bacteriosis Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> <i>Monilia</i> , <i>Monilinia</i> spp. Moteado del melocotonero, <i>Venturia carpophila</i>	0,6 - 0,8 %	1	-	600-1200 l/ha	Aplicar en tratamientos de invierno, desde caída de hojas hasta inicios de brotación o botón rosa del siguiente período vegetativo. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
Nogal	Bacteriosis <i>Monilia</i> , <i>Monilinia</i> spp.	0,4 - 0,8 %	1	-	500-1000 l/ha	Aplicar tratamientos desde la caída de la hoja hasta inicios de la brotación o botón rosa (tratamientos de otoño-invierno). Dosis aplicación: 5 - 7,5 kg/ha
Olivo	Repilo del olivo, <i>Venturia oleaginea</i>	0,4 - 0,6 %	Máx. 2	Mín. 14	600-1000 l/ha	Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85). Dosis: 4 - 6 kg/ha con un máximo de 10,5 kg/ha y año.
	Tuberculosis del olivo, <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i>	0,6 %				
Pistachero	Bacteriosis Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> <i>Monilia</i> , <i>Monilinia</i> spp.	0,6 - 0,8 %	1	-		Aplicar en tratamientos de invierno, desde la caída de la hoja hasta inicios de la brotación o botón rosa. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
	<i>Venturia</i> spp.				600-1000 l/ha	Contra moteado (<i>Venturia</i> spp.). Aplicar en tratamientos de invierno, desde la caída de la hoja hasta inicios de la brotación o botón rosa. Dosis: 5 - 7,5 kg/ha
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	0,5 - 0,9 %	3-4		600-1000 l/ha	

	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Bacteriosis	0,6 - 0,9 %	3-6	7-12	600-900 l/ha	Aplicar al aire libre y en invernadero desde que la 5 hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta madurez completa del fruto (BBCH 15-89). Dosis aplicación: 3,8 - 5 kg/ha (aire libre), 3,8 - 4,2 kg/ha (invernadero con lanza/pistola), 3,8 - 4,3 kg/ha (invernadero con mochila)
--	---	-------------	-----	------	--------------	--

PLAZOS DE SEGURIDAD

USO	P.S (días)
Berenjena, Tomate	10 (AIRE LIBRE) 3 (INVERNADERO)
Cucurbitáceas de piel comestible	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Ajo, Cebolla, Chalote, Cítricos, Olivo	15
Frutales de pepita, Melocotonero	21
Albaricoquero, Almendro, Avellano, Cerezo, Ciruelo, Granado, Nogal, Pistachero	N. P

PRECAUCIONES

En condiciones de frío y/o humedad elevada, pueden aparecer daños en hojas jóvenes de frutales, vid y otros cultivos. Sólo se debe aplicar con caldos neutros. Salvo en olivar, no aplicar en mezclas con correctores de pH, mojantes ni abonos foliares



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

**Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,
08017 Barcelona**