

NOMBRE DEL PRODUCTO

BOTREFIN®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BOTREFIN® A es un fungicida con acción preventiva y curativa para el tratamiento Botritis, Esclerotinia y Colletotricum en hortalizas y tabaco.

COMPOSICIÓN

Ciprodinil 37,5% + Fludioxonil 25%

FORMULACIÓN

Granulado dispersable en agua (WG)

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº ES-01164

PRESENTACIÓN

Botellas HDPE de 8 g, 10 g, 16 g, 20 g, 25 g, 40 g, 50 g, 100 g, 160 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g y 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 45 kg, 400 kg.

Bolsa de aluminio de 1 kg y 5 kg, contenida en una caja de cartón

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días)

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Berenjena	Podredumbre gris, Botrytis cinerea Sclerotinia spp.	1 Kg/ha	1-2	10-14 días	800-1500 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. En invernadero se dará una única aplicación por cultivo/temporada. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 67-89).
Calabacín	Podredumbre gris, Botrytis cinerea Sclerotinia spp.	1 Kg/ha	1	-	200 - 1500 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 71-79).
Cebolla	Podredumbre de la cebolla, Botryotinia squamosa Podredumbre gris, Botrytis cinerea	1 Kg/ha	1	-	300 - 1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 20-47).

Cebolleta	Podredumbre de la cebolla, Botryotinia squamosa Podredumbre gris, Botrytis cinerea	1 Kg/ha	1	-	300 - 1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 20-47).
Fresal	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	1 Kg/ha	1	--	500 - 2000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 55-89.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Podredumbre de la cebolla, Botryotinia squamosa Sclerotinia spp.	0,6 Kg/ha	1	--	300 - 1200 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante BBCH 11-49.
Lechuga y similares	Podredumbre de la cebolla, Botryotinia squamosa Podredumbre gris, Botrytis cinerea Sclerotinia spp.	0,6 Kg/ha	1-2	10-14 días	300 - 1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 12-49).
Pepino	Podredumbre gris, Botrytis cinerea Sclerotinia spp.	1 Kg/ha	1	-	200 - 1500 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 71-79).
Pimiento	Podredumbre gris, Botrytis cinerea Sclerotinia spp.	1 Kg/ha	1	-	800 - 1500 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 55-89).
Tabaco	Sclerotinia spp.	0,6 Kg/ha	1-2	14 días	500 - 1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 51-89).
Tomate	Podredumbre gris, Botrytis cinerea Sclerotinia spp.	1 Kg/ha	1	-	500 - 1500 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. En invernadero se dará una única aplicación por cultivo/temporada. Aplicar al inicio de la infección (BBCH 67-89).
Fresal	Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum	1 Kg/ha	1	--	500 - 2000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 55-89.

USO	P.S (días)
Fresal	1
Berenjena, Calabacín, Pepino, Pimiento, Tomate	3
Cebolla, Cebolleta, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Lechuga y similares, Tabaco	7

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

El uso de BOTREFIN® no resulta seguro para su aplicación manual en cultivos de porte alto en invernadero.

Se recomienda el uso de BOTREFIN® en alternancia de fungicidas con otro modo de acción, la aplicación en los estadios de desarrollo más tempranos o el uso del producto como tratamiento protector y el uso de otras medidas tales como variedades resistentes y buenas prácticas agrícolas.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

No realizar más aplicaciones de las indicadas en cada cultivo y en caso de ser necesario realizar más aplicaciones, tratar siempre de alternar con productos que no posean el mismo modo de acción.

Gestión de envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador.

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

**Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre,
28-30, 08017 Barcelona**