

NOMBRE DEL PRODUCTOBREK[®]**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

BREK[®] es un fungicida sistémico específico contra oídio, oidiopsis, moteado, cercospora y septoria de acción preventiva y curativa.

COMPOSICIÓN

Tetraconazol 12,5 % P/V

FORMULACIÓN

Microemulsión (ME)

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº 23.529

PRESENTACIÓN

Botella de HPDE de 1 lt

MODO DE ACCIÓN

BREK[®] es un producto fungicida sistémico de amplio espectro de acción que contiene tetraconazol en forma de microemulsión. BREK[®] pertenece a la familia química de los triazoles.

Las principales características del BREK[®]:

- Tiene muy buen efecto preventivo y curativo, lo que se traduce en una buena acción de choque
- BREK[®] se caracteriza por su alta eficacia contra los ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos sobre los que actúa inhibiendo la biosíntesis de los esteroides
- Gran selectividad para los cultivos y sus producciones, sin afectar en los procesos de polinización y de fermentación de los mostos.
- Buena dosificación en campo
- A efectos de la gestión de resistencias, el producto pertenece al **Grupo G** de la clasificación de FRAC
- Buen perfil toxicológico y respetuoso con la mayoría de los beneficiosos

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días) Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO (LMR en mg/kg)

USO	AGENTE	Dosis	Nº Apli c.	Interv alos	Condic. Especifico
Alcachofa	Oídio, Golovinomyces cichoracearum Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica	0,02 - 0,04 %	3	7-14	Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde desarrollo de las hojas hasta aparición del órgano floral. Dosis máxima de 0,32 l/ha.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Oídios, Erysiphaceae	0,02 - 0,04 %	3	7-14	Aplicar mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
	Oídio de los cereales,				

Cebada	Blumeria graminis Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda o enana de la cebada, Puccinia hordei Oidio de los cereales,	0,6 - 0,9 l/ha 0,9 - 1 l/ha	1		Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 25 (5 hijuelos o macollas visibles) hasta
Centeno	Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	0,6 - 0,9 l/ha	1		Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
Coníferas	Oídios, Erysiphaceae	0,02 - 0,04 %	3	7-14	Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Cucurbitáceas de piel comestible	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,02 - 0,04 %	3	7-12	(Solo aire libre excepto pepino que se puede aplicar en invernadero también): Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,4 l/ha.
Cucurbitáceas de piel no comestible	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,02 - 0,04 %	3	7-12	(solo aire libre): Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,4 l/ha.
Fresal	Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis	0,02 - 0,04 %	3	7-14	(solo invernadero) Aplicar mediante pulverización manual con lanza desde BBCH 60 (desde primeras flores abiertas) hasta BBCH 90 (segunda cosecha). Dosis máxima 0,4 l/ha.
Frondosas	Oídios, Erysiphaceae	0,02 - 0,04 %	3	7-14	Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila

					(uso amateur) desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Manzano	Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis	0,02-0,03 % 0,035 – 0,04%	3	14	Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,24 l/ha.
Ornamentales herbáceas	Oídios, Erysiphaceae	0,02 - 0,04 %	3	7-14	Aplicar mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Palmáceas	Oídios, Erysiphaceae	0,02 - 0,04 %	3	7-14	Aplicar mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Palmera datilera	Oídios, Erysiphaceae	0,02 - 0,04 %	3	7-14	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aplicar mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Peral	Moteado o roña del peral, Venturia pyrina	0,035 - 0,04 %	3	14	Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,24 l/ha.
Remolacha azucarera	Cercosporiosis de la remolacha, Cercospora beticola Oídio de la remolacha, Erysiphe betae	0,4 - 0,8 l/ha	1		Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde cuando la raíz ha alcanzado el tamaño de la cosecha. Emplear un volumen de caldo de 400-600 l/ha. El follaje no se destinará para alimentación animal.
Tomate	Oídio del tomate, Oidium neolycopersici Cladosporiosis del tomate, Fulvia fulva	0,025 - 0,04% 0,04 - 0,06 %	3	8-12	(solo aire libre): Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,4 l/ha. (solo aire libre): Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,6 l/ha.
	Oídio de los cereales, Blumeria graminis Septoriosis de las espigas del trigo,				

Trigo	Parastagonospora nodorum Septorios del trigo, Zymoseptoria tritici Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda del trigo, Puccinia triticina	0,6 - 0,9 l/ha 0,9 - 1 l/ha	1		Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha
Triticale	Oidio de los cereales, Blumeria graminis Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda del trigo, Puccinia triticina	0,6 - 0,9 l/ha 0,9 - 1 l/ha	1		Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
Vid	Oidio de la vid, Erysiphe necator	0,02 - 0,03 %	2	14	Aplicar en pulverización normal con tractor o manual con lanza desde desarrollo de las hojas hasta maduración. Dosis máxima de 0,24 l/ha.

USO	P.S. (días)
Fresal	1
Cucurbitáceas de piel comestible, Tomate	3
Alcachofa, Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Manzano, Peral	14
Remolacha azucarera	21
Vid	30
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Cebada, Centeno, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera, Trigo, Triticale	NP

PREPARACIÓN DEL CALDO

- Llenar el tanque de pulverización hasta la mitad con agua limpia y poner en marcha el sistema de agitación.
- Verter la cantidad de BREK[®] necesaria para una carga de la máquina de aplicación en el depósito de la máquina.
- Completar el depósito con el agua necesaria. Puede ser interesante comprobar pH y reajustar si fuera necesario.
- Mantener en funcionamiento el sistema de agitación del caldo durante el tratamiento.

Más información: Guía de buenas prácticas para la mezcla en campo de productos fitosanitarios (Magrama)

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Uso necesario de guantes, gafas y máscara de protección durante la manipulación y aplicación del producto.

Es importante prestar atención al correcto mantenimiento y calibración de la maquinaria de aplicación para una correcta distribución del producto.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre,
28-30, 08017 Barcelona