

NOMBRE DEL PRODUCTO

TWIST®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TWIST® es un fungicida que pertenece a la familia de las estrobilurinas de amplio espectro de acción y con elevada eficacia contra varias enfermedades.

COMPOSICIÓN

trifloxistrobin 50% p/p (500 g/kg). Contiene tierra de diatomeas (CAS nº 91053-39-3)

FORMULACIÓN

Granulado dispersable en agua (WG)

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº 22.338

PRESENTACIÓN

Bolsas de 0,300 kg

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicaciones y dosis autorizadas

USO	AGENTE	Dosis	Nº Apli	Interv	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Albaricoquero	Oídios, Erysiphaceae	0,015 %	3	10- 14 días		Máximo 225 g/ha por aplicación.
Arroz	Helmintosporiosis o mancha marrón del arroz (<i>Bipolaris oryzae</i>) y <i>Piricularia</i> del arroz (<i>Piricularia oryzae</i>).	0,25 kg/ha			200 – 400 l/ha	Aplicar durante BBCH 30-61
Melocotonero (incluye nectarino)	Oídios, Erysiphaceae	0,015 %	3	10- 14 días	300 - 1000 l/ha	Máximo 225 g/ha por aplicación.
Calabacín, Pepino	Oídios, Erysiphaceae	0,025 %	4	7 días		Máximo 375 g/ha por aplicación.
Fresal	Oídios, Erysiphaceae	0,025 %	3 (aire libre) 2 (invernadero)	7 días		Máximo 300 g/ha por aplicación
Manzano	moteado o roña del manzano (<i>Venturia inaequalis</i>) y oídios (<i>Erysiphaceae</i>).	0,0075 - 0,01% 0,015 %	4	10- 14 días		Máximo 150 g/ha por aplicación
Melón	Oídios, Erysiphaceae	0,25 kg/ha	4	7 días	300 - 1000 l/ha	En invernadero aplicar solo en cultivos de asiento. Máximo 250 g/ha por aplicación
Olivo	repilo del olivo (<i>Venturia oleaginea</i>) y aceituna jabonosa, antracnosis	0,01%	2 (max 1 en otoño)			Máximo 120 g/ha por aplicación
Peral	moteado o roña del peral (<i>Venturia pyrina</i>), oídios (<i>Erysiphaceae</i>) y estemfilosis (<i>Stemphylium</i> spp.).	0,0075 - 0,01%	3	10- 14 días		Máximo 150 g/ha por aplicación

		0,015 %				
Pimiento	oidio, oidiopsis, (Leveillula taurica)	0,025 %	3	7 días		Máximo 200 g/ha por aplicación
Tomate						Máximo 375 g/ha por aplicación
Vid	oidio de la vid (Erysiphe necator)	0,0125 - 0,015 %	4	10-14 días		Máximo 225 g/ha por aplicación

PLAZO DE SEGURIDAD

Uso	P.S. (días)
Fresal, Pimiento, Tomate	1
Calabacín, Melón, Pepino	3
Albaricoquero, Melocotonero	7
Manzano, Olivo, Peral	14
Arroz	28
Vid	30

El retorno a la faena en las áreas o cultivos tratados e invernaderos no debe realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación, salvo que se trate de actividades que no impliquen el contacto con el cultivo, utilizando en este caso el equipo de protección personal requerido para la aplicación. Durante las 24 horas siguientes, se deberá usar ropa de protección y guantes de protección química adecuados.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal. Para el caso de los cultivos de tomate y pimiento en invernadero aplicar mediante pulverización foliar con lanza o pistola, instalaciones de pulverización fijas automatizadas, pulverizadores autopulsados con barras verticales o pulverizadores hidroneumáticos tipo cañón atomizador con tractor, aplicado desde el exterior.

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga trifloxistrobin más de 3 veces por campaña en fresa, tomate, pimiento y peral, 4 veces en albaricoquero, manzano, melocotonero, melón, calabacín, pepino y vid, y 2 veces en olivo.

En caso de persistir las condiciones para el desarrollo de la enfermedad, deben aplicarse tratamientos con fungicidas autorizados con otro modo de acción. Utilizar los intervalos cortos en situaciones de riesgo alto de oídio.

Las aplicaciones de TWIST® deben iniciarse al comienzo del periodo de crecimiento, siempre de forma preventiva.

En cucurbitáceas, aplicar con carácter preventivo en un programa en el que se alterne con otros fungicidas de distinto modo de acción.

También, se debe tener en cuenta que este producto no se puede aplicar mediante medios aéreos.

OBSERVACIONES



Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,
08017 Barcelona