

NOMBRE DEL PRODUCTO

AZOFIN®

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

AZOFIN® es un producto a base de azoxistrobin, un fungicida del grupo de las estrobilurinas con acción sistémica y translaminar y efecto preventivo/curativo que impide la germinación de las esporas.

COMPOSICION

AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V

FORMULACIÓN

SUSPENSION CONCENTRADA [SC]

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº ES-01181

PRESENTACIÓN

Botellas (HDPE) de 1 l. Garrafas de (HDPE) de 5 l

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo/Condic Esp.
Ajo, Cebolla, Chalote	Alternaria spp. Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor Roya, Puccinia spp.	0,8-1 l/ha	3	7-10 días	300-600 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos
Alcachofa	Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,8-1 l/ha	3	7-10 días	800-1000 l/ha Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos. Uso al aire libre. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Apio	Cercosporiosis del apio Cercospora apii Septorios del apio, Septoria apiicola	0,8-1 l/ha	2	10-14 días	800-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Arroz	Helmintosporiosis o mancha marrón del arroz, Bipolaris oryzae Piricularia del arroz, Pyricularia grisea	1l/ha	2	10-14 días	200-400 l/haAplicar mediante pulverización normal desde BBCH 73 (grano lechoso temprano) hasta BBCH 81 (maduración de los frutos y semillas). No aplicar en suelos con menos de un 30% de contenido de arcilla.
Berenjena, Pimiento, Tomate	Oidio, oidiopsis, Leveillula taurica. Alternaria spp. Cladosporiosis del tomate, Fulvia fulva Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,7 - 0,8 l/ha	3	7-10 días	Aplicar mediante pulverización foliar mecánica o manual, de manera preventiva o a los primeros síntomas de la enfermedad. El volumen de caldo será ≤ 800 l/ha. Berenjena: Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos. Aplicar mediante pulverización foliar mecánica o manual, de manera preventiva o a los primeros síntomas de la

					enfermedad. El volumen de caldo será $\leq$ 800 l/ha. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Calabacín, Calabaza, Melón, Sandía, Pepino, Pepinillo	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii	0,7 - 0,8 l/ha	3	5-10 días	$\leq$ 800 l/ha Aplicar mediante pulverización manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. El volumen de caldo será 800 l/ha
Cebada, Trigo	Rincosporiosis, escaldado de cereales, Rhynchosporium secalis Roya, Puccinia spp. Septorios, Septoria spp	0,8-1 l/ha	2	10-14 días	200-400 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos Usar la dosis más alta para casos de presión de la enfermedad elevada. BBCH 32-61
Cebollino	Septorios, Septoria spp.	0,8-1 l/ha	2	7-10 días	600-800 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Berza, Col, Col de Bruselas, Coliflor	Alternaria spp. Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae	0,8-1 l/ha	2	10-14 días	600-800 l/ha Aplicar mediante pulverización manual, de manera preventiva o a los primeros síntomas de la enfermedad.
Espárrago	Roya del espárrago, Puccinia asparagi	0,8-1 l/ha	2	10-14 días	600-800 l/ha Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Usar la dosis más alta para casos de presión de la enfermedad elevada. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Fresal	Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum	0,8-1 l/ha	3	7-10 días	600-800 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos.
Guisante verde	Didymella spp. Oídio, Erysiphe spp. Podredumbre gris, Botrytis cinérea Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8-1 l/ha	2	10-14 días	600-800 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Hinojo	Septorios, Septoria spp	0,8-1 l/ha	2	7-10 días	600-800 l/ha. Aplicar mediante pulverización mecánica o manual a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos
Judía verde	Roya, Uromyces spp.	0,8-1 l/ha	2	10-14 días	600-800 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Lechuga y similares	Oídio, Golovinomyces cichoracearum Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae Sclerotinia spp.	0,8-1 l/ha	2	7-10 días	600-800 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos
Patata	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	3 l/ha	1	-	200-300 l/ha. Uso exclusivamente mediante aplicación en surco. Aplicar a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos.

Puerro	Cladosporiosis de la cebolla, Cladosporium allii- cepae Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor Roya, Puccinia spp	0,8-1 l/ha	3	7-10 días	300-600 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Uso menor de acuerdo con la jerarquía de cultivos.
Zanahoria	Alternaria spp.	0,8-1 l/ha	3	10-14 días	300-600 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos.
INVERNADERO					
Berenjena, Pimiento, Tomate	Cladosporiosis, Mildiu, Oidiopsis, Alternaria	0,8-1 l/ha	3	7-10 días	>800 l/ha. Aplicar mediante pulverización manual, de manera preventiva o a los primeros síntomas de la enfermedad.
Calabacín, Melón, Sandía, Pepino, Pepinillo	Mildiu Oidio	0,8-1 l/ha	3	5-10 días	>800 l/ha. Aplicar mediante pulverización manual, de manera preventiva o a los primeros síntomas de la enfermedad.

USO	P.S (días)
Berenjena, Calabacín, Calabaza, Melón, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate	3
Berza, col, Col de Bruselas, Coliflor, Fresal, Guisante verde, Judía verde	3
Ajo, Alcachofa, Apio, Arroz, Cebolla, Cebollino, Chalote, Lechuga y similares, Puerro	7
Lechuga y similares	7
Hinojo, Zanahoria	14
Cebada, Trigo	35
Espárrago, Patata	NP

MODO DE APLICACIÓN

Fungicida de uso profesional en cultivos y plantaciones agrícolas. Aplicación mediante pulverización foliar en todos los cultivos excepto en patata que se aplica en el surco de la siembra.

Seguir instrucciones de la etiqueta con dosis recomendada y calendario de aplicación.

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

Aplicación a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos. Para evitar el desarrollo de resistencias limitar el número de aplicaciones y alternar el uso de fungicidas de distinto modo de acción. Evitar el uso repetido de fungicidas del mismo modo acción cuando la tasa de infección es muy elevada. Seguir instrucciones de la etiqueta con dosis recomendada y calendario de aplicación.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30, 08017 Barcelona