

NOMBRE DEL PRODUCTO

NEORAM WG® DUO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NEORAM WG® DUO es un fungicida cúprico con acción preventiva para el tratamiento de Mildiu, Repilo, Antracnosis, Moteado, bacteriosis, así como otras enfermedades en numerosos cultivos.

COMPOSICIÓN

Oxicloruro de cobre 140 g/kg (14% p/p) + Hidróxido cúprico 140 g/Kg (14% p/p) (expresados en cobre metal) equivalentes a 280 g/kg (28% p/p)

FORMULACIÓN

GRANULOS HIDRODISPERSIBLES [WG].

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº ES-00863

PRESENTACIÓN

Sacos de polietileno multicapa de papel 1, 2, 2'5, 5, 10, 20 y 25 kg

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD. Aplicaciones y dosis autorizadas

USO	AGENTE	Dosis (kg/ha)	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo (L/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajo	Mildiu de la cebolla, <i>Peronospora destructor</i>	2 - 2,7	3	7-12 días	600-1000	Aplicación al aire libre durante BBCH 14-47.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	<i>Gloeosporium</i> , <i>Gloeosporium</i> spp.	2	1	--	1000	Aplicación al aire libre en todos los estadíos. Contra antracnosis (<i>Gloeosporium</i> spp.).
	<i>Pseudomonas syringae</i>					Aplicación al aire libre en todos los estadíos.
	<i>Peronosporaceae</i>					Contra mildius (familia <i>Peronosporaceae</i>). Aplicación al aire libre en todos los estadíos.
Avellano	Socarrina, mancha foliar del castaño, <i>Mycosphaerella maculiformis</i>	3	1	--	1000-1800	Aplicación al aire libre durante todos los estados.
Berenjena	Mildiu del pimiento, <i>Phytophthora capsici</i>	2 - 2,6	5	7-12 días	600-800 (aire libre) 600-1200 (inv.)	Aplicación al aire libre (máx. 5 aplicaciones) e invernadero (máx. 3 aplicaciones), durante BBCH 15-89.
	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>					Aplicación al aire libre (máx. 5 aplicaciones) e invernadero (máx. 3 aplicaciones). Aplicar durante BBCH 15-89.
	<i>Pseudomonas syringae</i>					
Castaño	Socarrina, mancha foliar del castaño, <i>Mycosphaerella maculiformis</i>	3	1	--	1000-1800	Aplicación al aire libre durante todos los estados.
Cebolla	Mildiu de la cebolla, <i>Peronospora destructor</i>	2 - 2,7	3	7-12 días	600-1000	Aplicación al aire libre durante BBCH 14-47.
Cítricos	<i>Phytophthora</i> spp.	3,5	1	--	1000-1500	Aplicación al aire libre durante BBCH 73-PS.

Coníferas	Gloeosporium, Gloeosporium spp.	2	1	--	1000	Exclusivamente para uso ornamental. Aplicación al aire libre en todos los estadíos. Contra antracnosis (Gloeosporium spp.).
	Pseudomonas syringae					Exclusivamente para uso ornamental. Aplicación al aire libre en todos los estadíos.
	Peronosporaceae					Exclusivamente para uso ornamental. Contra mildius (familia Peronosporaceae). Aplicación al aire libre en todos los estadíos
Cucurbitáceas de piel comestible	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	1,8 - 2,2	4	7-12 días	600-800	Aplicación al aire libre en pepino y calabacín durante BBCH 13-PS.
Frondosas	Gloeosporium, Gloeosporium spp.,	2	1	--	1000 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental. Aplicación al aire libre en todos los estadíos. Contra antracnosis (Gloeosporium spp.).
	Pseudomonas syringae					Exclusivamente para uso ornamental. Aplicación al aire libre en todos los estadíos.
	Peronosporaceae					Exclusivamente para uso ornamental. Contra mildius (familia Peronosporaceae). Aplicación al aire libre en todos los estadíos.
Frutales de hueso	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	1	1	--	1000-1500	Aplicación al aire libre en melocotonero, cerezo, ciruelo, guindo y albaricoquero. Aplicar durante BBCH 91-55/en ausencia de frutos. Contra Wilsonomyces carpophilus (=Coryneum beijerinckii).
	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans Ciruelas del diablo, lepra del ciruelo, Taphrina pruni Moteado del melocotonero, Venturia carpophila					Aplicación al aire libre en melocotonero, cerezo, ciruelo, guindo y albaricoquero. Aplicar durante BBCH 91-55/en ausencia de frutos.
	Lepra del cerezo, Taphrina wiesneri					Contra Taphrina wiesneri (=T. cerasi). Aplicación al aire libre en melocotonero, cerezo, ciruelo, guindo y albaricoquero. Aplicar durante BBCH 91-55/en ausencia de frutos.
Frutales de pepita	Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis	0,9 - 2,5	1	--	500-1500	Aplicación al aire libre en peral y manzano.

	Moteado o roña del peral, Venturia pyrina					Aplicar durante BBCH 03-55/en ausencia de frutos.
	Chancro europeo, Neonectria ditissima					Contra Neonectria ditissima (=Nectria galligena). Aplicación al aire libre en peral y manzano. Aplicar durante BBCH 91-55/en ausencia de frutos.
Kiwi	Pseudomonas syringae	1,7	1	--	1000-1500	Aplicación al aire libre durante BBCH 90-63 en ausencia de frutos (PS: NO PROCEDE) o BBCH 63-PS.
Lechuga	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	2 - 2,5	4	7-12 días	800	Aplicación al aire libre durante BBCH 13-PS.
Melón	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	1,8 - 2,2	5	7-12 días	600-800	Aplicación al aire libre durante BBCH 13-PS.
Nogal	Socarrina, mancha foliar del castaño, Mycosphaerella maculiformis	3 - 3,5	1	--	1000-1800	Aplicación al aire libre en todos los estados.
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi	1,8 - 2	2	14 días	1000	Aplicación al aire libre en ausencia de frutos.
Ornamentales herbáceas	Gloeosporium, Gloeosporium spp.	2	1	--	1000	Incluye especies florales. Aplicación al aire libre en todos los estadios. Contra antracnosis (Gloeosporium spp.).
	Pseudomonas syringae					Incluye especies florales. Aplicación al aire libre en todos los estadios.
	Peronosporaceae					Incluye especies florales. Contra mildius (familia Peronosporaceae). Aplicación al aire libre en todos los estadios.
Palmáceas	Gloeosporium, Gloeosporium spp.	2	1	--	1000	Aplicación al aire libre en todos los estadios. Contra antracnosis (Gloeosporium spp.).
	Pseudomonas syringae					Aplicación al aire libre en todos los estadios.
	Peronosporaceae					Contra mildius (familia Peronosporaceae). Aplicación al aire libre en todos los estadios.
Palmera datilera	Gloeosporium, Gloeosporium spp.	2	1	--	1000	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aplicación al aire libre en todos los estadios. Contra antracnosis (Gloeosporium spp.).
	Pseudomonas syringae					Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano).

	Peronosporaceae					Aplicación al aire libre en todos los estadios. Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Contra mildius (familia Peronosporaceae). Aplicación al aire libre en todos los estadios.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i> Mildiu del pimiento, <i>Phytophthora capsici</i> <i>Pseudomonas syringae</i>	2 - 2,6	5	7-12 días	600-800 (aire libre) 600-1200 (inv.)	Aplicación al aire libre (máx. 5 ap.) e invernadero (máx. 3 ap.), durante BBCH 15-89. El PS será de 10 días en tomate (industrial).
Vid	Black rot, podredumbre negra de la vid, <i>Phyllosticta ampellicida</i> Mildiu de la vid, <i>Plasmopara viticola</i>	1,25 - 2,5	1	--	1000	Aplicación al aire libre durante BBCH 13-60 (en ausencia de frutos) o BBCH 60-83.

MODO DE APLICACION

NEORAM WG® DUO debe ser usado siguiendo siempre una estrategia de control preventivo, antes del establecimiento de la enfermedad. Aplicar en pulverización foliar, tratando de cubrir toda la superficie por el haz y el envés con intervalos mínimos de 7-12 días con los volúmenes indicados. En frutales de pepita, aplicaciones frecuentes tras floración pueden incrementar el russeting en variedades sensibles. En condiciones de frío y/o humedad elevada, pueden aparecer daños en hojas jóvenes de frutales, vid y otros cultivos. Sólo se debe aplicar con caldos neutros. No aplicar en mezclas con correctores de pH, mojantes ni abonos foliares.

PLAZOS DE SEGURIDAD

Uso	PS (días)
Vid	21
Kiwi	20
Avellano, Castaño, Cítricos, Nogal	14
Tomate industria	10
Lechuga, Melón	7
Ajos, Berenjena, Cebolla, Cucurbitáceas de piel comestible, Tomate	3
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Olivo, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera	NO PROCEDE



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes
Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30