

NOMBRE DEL PRODUCTO

SCATTO®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SCATTO® es un insecticida de la familia de los piretroides que se presenta como concentrado emulsionable para aplicación foliar y con actividad por contacto e ingestión.

COMPOSICIÓN

DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V

FORMULACIÓN

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el nº ES-00012

PRESENTACIÓN

Garrafas de plástico (HDPE) de 5 y 10 l.

MODO DE ACCIÓN

SCATTO® es eficaz sobre numerosos insectos chupadores y masticadores, en estado de larvas o adultos que afectan a plantas. Actúa sobre la transmisión nerviosa de los insectos y posee además un efecto repelente.

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD (PS en días) Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO (LMR en mg/kg)

USO	AGENTE	Dosis	N Aplic.	Inter .	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajo	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Trips	0,3-0,5 l/ha	1-3	14	400-500 l/Ha	
Alfalfa	Apion del guisante, Holotrichapion pisi Cuca de la alfalfa, Colaspidema atrum Mosquitos verdes, Empoasca spp.	0,25 l/ha	1-2	14	400 l/Ha	
Algodonero	Heliothis, Helicoverpa spp.	0,5 - 0,7	1-2	14	300-350 l/ha	Aplicar a la aparición de la plaga en el estadio de crecimiento BBCH 69- 79 (fin de la floración hasta que el 90 % de las cápsulas alcanzan el tamaño final).
Almendro	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 %	1-2	14	1.400 l/Ha	
	Espumadora Neophilaenus Campestris Espumadora, Philaenus Spumariusº					
	Lepidópteros	0,05 %			1.000 l/Ha	
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella				1.000 l/Ha	
Apio	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	700 l/Ha	Aire libre
	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %				
	Lepidópteros					

Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %	1-3	7	500-1.000 l/Ha	Aire libre e invernadero
	Trips				500-1.000 l/Ha	
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %			700 l/Ha	
Avellano	Chinches, heterópteros Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 %	1-2	14	1.400 l/Ha	
	Lepidópteros	0,05 %			1.000 l/Ha	
Berenjena	Chinches, heterópteros	0,05 %	ver cond. esp.	7	600-1.000 l/Ha. al aire libre y 600-1.400 l/Ha en invernadero	Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %				Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero
	Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros	0,05 %				
	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula	0,03 %				
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	300-500 l/Ha	Aire libre e invernadero	
Castaño	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 %	1-2	14	1.400 l/Ha	
	Lepidópteros	0,05 %			1.000 l/Ha	
Cebolla	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Trips	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400-500 l/Ha	
Cereales de invierno / primavera	Áfidos, pulgones, Aphididae Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1		400-600 l/Ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.
Cerezo	Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi	0,04 - 0,05 %	1		1.000-1.400 l/Ha	
Colza	Lepidópteros Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 - 0,05 %	1-3	14	600 l/Ha.	
					600 l/Ha	
Cucurbitáceas	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400-500 l/Ha	Aire libre e invernadero
	Chinches, heterópteros Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis.	0,05 %			600-1.000 l/Ha al aire y hasta 1.400 l/Ha en invernadero.	
Espárrago	Áfidos, pulgones, Aphididae Criocero del espárrago, Crioceris asparagi Trips	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	600-1000 l/ha	Aplicación en campo posterior a la cosecha. Aplicar a la aparición de la plaga.
Fresal	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %	1-3	14	500-1.000	Aire libre e invernadero.
Frutales de hueso	Chinches, heterópteros Áfidos, pulgones, Aphididae	0.03-0.05%	1		1000-1400 l/Ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.
	Espumadora, Neophilaenus campestris Espumadora, Philaenus spumarius Lepidópteros					
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,05 %				

Frutales de pepita	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 - 0,05 %	1-2	14	1.000-1.400 l/Ha	
	Espumadora, Philaenus spumarius					
	Chinchas, heterópteros					
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,05 %			1.000 l/Ha	
	Lepidópteros	0,035 %			1.000-1.400 l/Ha	
Garbanzo	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	500-1.000 l/Ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Lepidópteros					
Garbanzo verde	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	500-1.000 l/Ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Lepidópteros					
Girasol	Lepidópteros	0,03 - 0,05 %	1		600 l/ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Guisante para grano	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,25 l/ha	1-2	14	1.000 l/Ha	Dosis contra Aphis fabae (pulga de las habas): 0,3 l/ha.
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp	0,3 - 0,5 l/ha				
	Lepidópteros				1.000 l/ha	
	Trips					
Guisante verde	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,25 l/ha	1-2	14	1.000 l/Ha	Dosis contra Aphis fabae (pulga de las habas): 0,3 l/ha.
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Lepidópteros	0,3-0,5 l/ha			1000 l/ha	
	Trips					
Haba verde	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	500-1.000 l/Ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Lepidópteros					
Hortalizas del género Brassica	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %	1-2	14	500 l/Ha	
	Lepidópteros					
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp	0,3 - 0,5 l/ha				
Judía verde	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	500-1.000 l/Ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Lechuga	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400-500 l/Ha	Aire libre
	Lepidópteros	0,05 %		7	500-1.000 l/Ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Lenteja	Áfidos, pulgones, Aphididae		1-2	14	500-1.000 l/Ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha				
	Lepidópteros					

Lenteja verde	Áfidos, pulgones, Aphididae Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	500-1.000 l/Ha	
Lima	Áfidos, pulgones, Aphididae Espumadora, Philaenus spumarius Espumadora, Philaenus spumarius Psílidos, Psyllidae	0,3%	1		1.000 L/Ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga
Limonero	Áfidos, pulgones, Aphididae Espumadora, Philaenus spumarius Psílidos, Psyllidae	0,03 %	1		1000 l/ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga
Maíz	Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	600 l/Ha	
		0,5 l/ha				
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Áfidos, pulgones, Aphididae Espumadora, Philaenus spumarius Psílidos, Psyllidae	0,03 %	1		1000 l/ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga
Nogal	Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros	0,03 %	1-2	14	1.400 l/Ha	
		0,05 %			1.000 l/Ha	
Naranja	Áfidos, pulgones, Aphididae Espumadora, Philaenus spumarius Psílidos, Psyllidae	0,03 - 0,05 %	1		1000 l/ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,05 %				
Olivo	Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides Caparreta negra, Saissetia oleae Espumadora, Philaenus spumarius Mosca del olivo, Bactrocera oleae Prays, polilla del olivo, Prays oleae	0,05 %	1		1.000-1.400 l/Ha.	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.
	Algodón del olivo, tramilla, Euphyllura olivina	0,03 - 0,05 %			1.000-1.400 l/Ha.	
	Prays, polilla del olivo, Prays oleae	0,03 %			1.000-1.400 l/Ha	
Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %	1-3	7	500-1.000 l/Ha	Aire libre e invernadero
	Espumadora, Philaenus spumarius					
	Trips	0,035 %			700 l/Ha	
	Lepidópteros	0,07 %				
	Moscas blancas, Aleyrodidae					

Patata	Rosquilla negra, Spodoptera littoralis	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400-500 l/ha		
	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata	0,5 l/ha			600 l/ha		
Perejil	Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros	0,05 %	1-2	14	700 l/ha	Aire libre	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha					
Pimiento	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula	0,03 %	1-3	7	600-1000 (AL) 600-1.400 l/Ha (INV)	Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero en invernadero	
	Chinches, heterópteros Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,5%			600-1.000 l/ha	Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero	
		0,3 - 0,5 l/ha			300-500 l/ha	Aire libre e invernadero	
Puerro	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400-500 l/Ha		
	Trips	0,03 - 0,05 %					
Rábano	Áfidos, pulgones, Aphididae Coleópteros Lepidópteros Liriomiza, Liriomyza spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	500-1000 l/ha	Aplicar a la aparición de la plaga en el estadio BBCH 15-48 (desde la 5ª hoja desplegada hasta que se alcanza el 80 % del diámetro esperado de la raíz).	
Remolacha azucarera	Lepidópteros	0,5 l/ha	1		400-600 l/Ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp				300-500 l/ha		
	Áfidos, pulgones, Aphididae				400-600 l/Ha		
Rúcula	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %	1-2	14	700 l/ha		
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha			700 l/Ha		
	Lepidópteros	0,05 %					
Tabaco	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	500-1.000 l/Ha		
					500-1.000 l/Ha		
Tomate	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula	0,03 %	1-3	ver cond . esp.	600-1.000 l/Ha. al aire libre y 600- 1.400 l/Ha en invernader	Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre.	
	Chinches, heterópteros	0,05 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Lepidópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %			300-500 l/Ha.	Aire libre e invernadero, con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha					
Vid	Polilla del racimo, Lobesia botrana	0,05 - 0,07 %	1-3	14	1.000 l/Ha	Tratar la 1ªgeneración a dosis de 0,05% y la 2ª y 3ª a dosis de 0,05-0,07%.	
	Mosquito verde, Jacobiasca lybica Mosquitos verdes, Empoasca spp	0,05 %			1000 l/ha		
	PHILAENUS Espumadora, Philaenus spumaris	0,05 - 0,07 %			1.000 l/Ha		Tratar la 1ªgeneración a dosis de 0,05% y la 2ª y 3ª a dosis de 0,05-0,07%.

Zanahoria	Áfidos, pulgones, Aphididae Coleópteros Lepidópteros Liriomiza, Liriomyza spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	500-1000 l/ha	Aplicar a la aparición de la plaga en el estadio BBCH 15-48 (desde la 5ª hoja desplegada hasta que se alcanza el 80 % del diámetro esperado de la raíz).
-----------	---	----------------	-----	----	---------------	--

Uso	P.S DIAS
Apio, Berenjena, Cucurbitáceas, Fresal, Perejil, Rúcula, Tomate y Pimiento	3
Ajo, Cebolla, Cerezo, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Garbanzo verde, Garbanzo, Guisante para grano, Guisante verde, Haba verde, Hortalizas del género Brassica, Judía verde, Lechuga, Lenteja verde, Lenteja, Olivo, Patata, Puerro, Rábano, Tabaco, Vid, Zanahoria	7
Alfalfa	14
Algodonero, Almendro, Avellano, Castaño, Cereales de invierno / primavera, Maíz, Nogal, Remolacha azucarera, Mandarinero (incluido clementino e híbridos), Naranja, Lima y Limonero	30
Colza	45
Girasol	60
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Espárrago, Ornamentales herbáceas	N.P

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar. No superar las dosis máximas de 700 ml/ha de producto formulado en frutales de hueso, vid y olivo; y 250 ml/ha en alfalfa. Para el resto de los cultivos, la dosis máxima será 500 ml/ha

CONSEJO DE USO Y PRECAUCIONES

Uso destinado a agricultores y aplicadores profesionales. Para evitar la aparición de resistencias, utilizar este producto en un programa de tratamientos alternados con otros insecticidas de diferentes modos de acción, realizando como máximo el número de aplicaciones indicadas en etiqueta. Para proteger a los artrópodos no objetivo, las abejas y otros insectos polinizadores, así como a los organismos acuáticos, siga las instrucciones específicas de la etiqueta. El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga, aplicación y al manipular o limpiar el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En invernadero, cuando el cultivo supere el metro de altura, la anchura libre entre líneas deberá ser superior a 1,2m. Ventilar los invernaderos tratados y no entrar al cultivo hasta que el producto este seco.



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,
08017 Barcelona

