

NOMBRE DEL PRODUCTO

TEMPIO® A

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TEMPIO® A es un fungicida cúprico con acción preventiva y curativa para el tratamiento del Mildiu en varios cultivos

COMPOSICIÓN

BENALAXIL-M 5% + OXICLORURO DE COBRE 15% (exp. en Cu) + HIDROXIDO CUPRICO 15% (exp. en Cu) [WG] P/P

FORMULACIÓN

Granulado dispersable en agua

Nº DE REGISTRO

Inscrito en el R.O.P y M.F. con el Nº ES-00862

PRESENTACIÓN

Sacos multicapa de 1 y 5 kg

RECOMENDACIONES DE USO, PLAZO DE SEGURIDAD Y LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO

Aplicaciones y dosis autorizadas

USO	AGENTE	Dosis	Nº Apli	Interv .	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	2,4 Kg/ha	3	7 - 14 días	300 - 1000 l/ha	Aplicación al aire libre. Aplicar durante BBCH 40-85
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	2,4 Kg/ha	3	7 - 14 días	300 - 1000 l/ha	Aplicación al aire libre. Aplicar durante BBCH 40-85.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	2,4 Kg/ha	3	7 - 14 días	300 - 1000 l/ha	Aplicación al aire libre. Aplicar durante BBCH 40-85.
Vid	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	2 Kg/ha	1	-	200 - 1000 l/ha	Aplicación al aire libre. Aplicar durante BBCH 53-81.

PLAZO DE SEGURIDAD

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	3
Patata	14
Vid	28

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar, mecánica o manual, tratando de mojar toda la superficie por el haz y el envés con intervalos mínimos de 7 a 14 días. Aplicar mediante pulverización normal o atomización, manualmente o con tractor.

En berenjena, patata y tomate, aplicar durante los estadios fenológicos de BBCH 40-85 (formación de brotes laterales a maduración). En vid, aplicar durante BBCH 53-81 (aparición del órgano floral a comienzo de maduración).

Para la preparación del caldo, calcule la cantidad de agua y producto necesario. Llene el tanque de pulverización con la mitad del agua que necesite; con el sistema de agitación funcionando, añada el producto y posteriormente el resto del agua. Continúe agitando hasta obtener una mezcla homogénea

TEMPIO[®] A debe ser usado siguiendo siempre una estrategia de control preventivo, antes del establecimiento de la enfermedad. Puede utilizarse como parte de un programa de Manejo Integrado que incluya prácticas físicas, biológicas y culturales, supervisando las parcelas para detectar los primeros síntomas sobre brotes, hojas y/o racimos y aplicando a su aparición y sólo cuando se hayan alcanzado los umbrales mínimos (según los programas de Sanidad Vegetal de cada CCAA). No realizar más aplicaciones de las indicadas en cada cultivo y en caso de ser necesario realizar más aplicaciones, tratar siempre de alternar con productos que no posean el mismo modo de acción.

OBSERVACIONES



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado en el depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Producto distribuido por GOWAN ESPAÑOLA
FITOSANITARIOS, S.L. Ronda General Mitre, 28-30,
08017 Barcelona